

est de Valenciennes (in *Voy. Venus*, page 318); 2^o que ce genre faisait partie de la famille des Squammipennes, tandis qu'il appartient réellement à la famille des *Sparidae* et qu'il doit être placé à la suite du genre *Aplodon*.

Séance du 7 juillet 1883.

PRÉSIDENTE DE M. SAUVAGE.

M. Sauvage fait les communications suivantes :

*Sur une collection de poissons recueillie dans le lac Biwako
(Japon) par M. F. Steenackers,
par M. H. E. SAUVAGE.*

M. Francisque Steenackers, chargé d'une mission scientifique au Japon, a recueilli au centre de Nippo, dans le lac Biwako, cette localité si célèbre par la présence de la grande Salamandre, une fort intéressante collection de poissons qu'il a dernièrement fait parvenir au Muséum d'histoire naturelle; cette collection est d'autant plus précieuse qu'elle provient d'une localité qui n'a pas encore été explorée par les ichthyologistes et que presque tous les animaux sont accompagnés du nom local.

Le lac Biwako, auquel la rivière Setangarwa sert de déversoir, reçoit plusieurs cours d'eau, tels que les rivières Nihougawa, Aitchizawa, Iyachougaza, Amanagawa, Izidagawa; il est bordé par les districts Kourita, Iachizau, Karva-i, Handzalki, Aitchi, Inongama, Saka, Asa-i, Iko, Ousa-i, Tkashima.

C'est dans ce lac et dans les cours d'eau qui s'y déversent que M. Steenackers a recueilli les espèces suivantes :

1. *Gobius genionema*, Hilgendorf. Nom local *Chivara*.
2. *Silurus asotus*, L.

3. *Pseudobagrus aurantiacus*, Schl. Nom local *Gigui*.

4. *Liobagrus Reini*, Hilgendorf.

5. *Pseudobagrus nudiceps*, n. sp.

D. I, 6; A. 23; P. I, 7.

Longueur de la tête contenue cinq fois dans la longueur totale; dessus de la tête osseux, granuleux; processus occipital plus long que large, étroit; os basilaire triangulaire, aussi long que le processus occipital, partagé par une suture transverse. Dorsale plus haute que le corps; épine dentelée, aussi longue que la tête, sans le museau. Épine pectorale de même longueur que l'épine dorsale, de même longueur que celle-ci, très fortement dentelée. Adipeuse de même longueur que l'anale. Dents du palais suivant une bande rétrécie au milieu; barbillons maxillaires s'étendant jusqu'aux pectorales. Longueur, 0,090.

6. *Oncorhynchus lycaodon*, Pall. Nom local *Chalké*.

7. *Oncorhynchus Scouleri*, Rich. Nom local *Amenoouo*

8. *Plecoglossus altivelis*, Schlg. Nom local *Ai*, *Giretzou*.

9. *Cyprinus carpio*, Lin.

9a. — var. *melanotus*, Schlg.

9b. — var. *hæmotopterus*, Schlg.

10. *Carassius auratus*, Lin. (Jeune. Nom local *Chibouna*, *Kouromoroko*).

10a. *Id.* var. *melanotus*, Schlg. (Bâtard de *Koi* et de *Founa*).

10b. *Id.* var. *hæmotopterus*, Schlg. Nom local *Koubouma*.

10c. *Id.* var. *grandoculis*, Schlg.

10d. *Id.* var. *Langsdorsii*, Schlg. Nom local *Chiwara*.

10e. *Id.* var. *Cuvieri*, Schlg. Nom local *Dougko*, *Momidji-founa*.

11. *Barbus esocinus*, Schlg. Nom local *Koa-i*?

12. *Pseudogobio esocinus*, Schlg.

13. *Sarcocheilichthys variegatus*, Schlg. Nom local *Clmigai*.

14. *Achilognathus intermedius*, Schlg. Nom local *Gomatabira*.

15. *Achilognathus melanogaster*, Blkr. Nom local *Kouroutabira*.

16. *Achilognathus Steenackeri*, n. sp.

D. 14,15 ; A. 11,12 ; L. lat. 38.

Hauteur du corps contenue près de trois fois et demie dans la longueur totale ; longueur de la tête cinq fois et un tiers dans la même dimension. Museau aussi long que l'œil, dont le diamètre est compris trois fois et demie dans la longueur de la tête ; espace interorbitaire plus large que le diamètre de l'œil ; barbillons très courts ; dents pharyngiennes non dentelées ; de gros pores autour de la partie supérieure de l'œil et sur le museau chez les mâles, nuls chez les femelles. Dorsale insérée à égale distance du museau et de la base de la caudale chez les femelles, un peu plus près de la base de la caudale chez les mâles ; pectorales s'étendant à l'origine des ventrales chez les femelles, un peu plus courtes chez les mâles. Corps de couleur argenté ; chez les femelles une bande cérulescente sur le pédicule caudal ; chez les mâles des lignes cérulescentes longitudinales dans la partie postérieure du corps. Un long tube externe urogénital chez les femelles. Longueur, 0, 100.

Nom vulgaire *Founa*, *Akibabira*.

17. *Squalius caeruleus*, n. sp.

D. 9 ; A. 8 ; V. 8 ; L. lat. 45.

Hauteur du corps égale à la longueur de la tête, contenue cinq fois un quart dans la longueur totale. Mu-

seau un peu plus court que le diamètre de l'œil, qui fait le quart de la longueur de la tête; espace interorbitaire bombé, un peu plus large que le diamètre de l'œil; sous-orbitaires étroits; quelques pores au dessus du museau. Dorsale insérée un peu plus près de l'extrémité du museau que de la base de la caudale, un peu en avant des ventrales; caudale échancrée. Ligne latérale droite. Dents pharyngiennes 5-2. Coloration argentée, rembrunie sur le dos et le dessus de la tête; une large bande bleuâtre le long de la ligne latérale. Longueur, 0,120.

Nom local : *Morolko*.

18. *Squalius hakuensis*, Gthr.

D. 9; A. 9; V. 40; L. lat. 80.

Hauteur du corps cinq fois deux tiers, longueur de la tête cinq fois dans la longueur totale. Museau pointu, plus long que l'œil, dont le diamètre est compris quatre fois deux tiers dans la longueur de la tête; espace interorbitaire plus large que le diamètre de l'œil, sousorbitaires étroits. Dorsale insérée plus près de l'origine de la caudale que de l'extrémité du museau, vis à vis les ventrales; caudale échancrée. Ligne latérale droite. Dents pharyngiennes 5-2. Coloration uniforme, rembrunie sur le dos et le dessus de la tête. Longueur, 0,250.

Nom local : *Ougoui*.

19. *Squalius japonicus*, n. sp.

D. 9; A. 8; V. 8; L. lat. 38.

Hauteur du corps cinq fois et demie, longueur de la tête quatre fois deux tiers dans la longueur totale. Museau à peine plus long que l'œil dont le diamètre est contenu trois fois et demie dans la longueur de la tête; espace interorbitaire plat, un peu moins large que le diamètre de l'œil; sousorbitaires étroits; pas de pores au museau.

Dents pharyngiennes 5-3. Dorsale insérée un peu plus près de l'extrémité du museau que du pédicule caudal, un peu en avant des ventrales ; caudale échancrée. Ligne latérale droite. Couleur argentée ; des points noirs le long du dos et sur chaque écaille de la ligne latérale. Longueur, 0,085.

Nom local : *Ounagni*.

20. *Opsariichthys Sieboldi*, Schl.

21. *Opsariichthys uncirostris*, Schl. Nom local *Wabaka*.

22. *Opsariichthys platypus*, Schl. Nom local *Hai*.

23. *Opsariichthys Temminckii*, Schl. Nom local *Hayé* ; *Sikawa*.

24. *Opsariichthys Steenackeri*, n. sp.

D. 9 ; A. 17 ; L. lat. 75.

Corps allongé, semblable à celui du *Squaliobarbus curriculus* ; hauteur contenue cinq fois, longueur de la tête cinq fois et demie dans la longueur totale. Museau aussi long que l'œil, dont le diamètre est contenu quatre fois dans la longueur de la tête ; pas de barbillons ; mâchoire supérieure recouvrant légèrement l'inférieure ; dents pharyngiennes 5,4,2, uncinées, celles de la rangée intermédiaire crénelées au sommet. Dorsale insérée à égale distance de l'extrémité du museau et de la base de la caudale, un peu en arrière de l'origine des ventrales ; pectorales presque aussi longues que la tête ; ventrales insérées un peu plus près des pectorales que de l'anale. Ligne latérale recourbée. Péritoine noir. Longueur, 0,330.

Nom vulgaire : *Masou* ; *Ida*.

25. *Phoxinus Steindachneri*, n. sp.

D. 9 ; A. 9 ; L. lat. 80.

Hauteur du corps six fois deux tiers, longueur de la

tête cinq fois un tiers dans la longueur totale. Museau plus long que l'œil dont le diamètre est compris quatre fois un tiers dans la longueur de la tête ; espace interorbitaire plus large que le diamètre de l'œil. Dorsale commençant à égale distance du pédicule de la caudale et du centre de l'œil ; caudale échancrée. Jaunâtre, avec de nombreux points et des taches nuageuses noirâtres ; une large bande noire allant de l'œil à la caudale ; dorsale et caudale rembrunies ; dessus de la tête et extrémité du museau noir. Longueur, 0,170.

Nom vulgaire : *Aboura Motzou*.

Genre Tribolodon, n. gen. (1).

Écailles petites ; ligne latérale recourbée en bas, mais se terminant au milieu de la caudale. Dorsale courte, avec moins de 9 rayons divisés, opposée aux ventrales ; anale courte. Pas de barbillons ; bouche petite ; sousorbitaires non dilatés ; des pseudobranchies. Dents pharyngiennes 5,2, recourbées en crochet. Péritoine piqueté de noir.

Du groupe des *Danionina*.

26. *Tribolodon punctatum*, n. sp.

D. 9 ; A. 10 ; L. lat. 75.

Corps allongé, la hauteur étant contenue six fois et demie dans la longueur totale ; tête cinq fois et un tiers dans la même dimension. Museau aussi long que l'œil, dont le diamètre est compris trois fois et demie dans la longueur de la tête ; espace interorbitaire aussi large que le diamètre de l'œil. Dorsale commençant au milieu de l'espace compris entre l'extrémité du museau et l'origine de la caudale, un peu en avance sur les ventrales ; cau-

(1) De *τριβελα*, herse ; *ὀδούς*, dent.

dale échanquée. Dessus de la tête noir; de petits points noirs sur les écailles; une bande cérulescente le long du dos; extrémité de la dorsale noire; ventrales jaunes. Longueur, 0,095.

27. *Misgurnus anguillicandatus*, Cant. Nom local, *Kappe Mouchii*, *Razeron Hazami*.

M. Steenachers a également recueilli quelques espèces ne provenant pas du lac Biwako; ce sont :

28. *Centridermichthys fasciatus*, Hkl.

29. *Gobius urotænia*, Hilgendorf. Nom local, *Hadgé*.

30. *Gobius castaneus*, O'Schang.

31. *Eleotris obscura*, Schl.

32. *Anguilla bostonensis*, Les.

*Sur une collection de poissons recueillie dans le Mé-Nam
(Siam) par M. Harmand,
par M. H. E. SAUVAGE.*

Depuis que nous avons publié le résultat de nos recherches sur la faune ichthyologique de l'Indo-Chine (1), M. le Dr Harmand, continuant ses fructueuses recherches, a adressé au Muséum une nombreuse collection de poissons recueillie dans le Mé-Nam, collection qui augmente singulièrement notre connaissance sur la faune ichthyologique du royaume de Siam. Les espèces recueillies par le savant voyageur sont les suivantes :

1. *Toxotes microlepis*, Gthr.

2. *Toxotes jaculator*, Pall.

(1) *Recherches sur la faune ichthyologique de l'Asie et description d'espèces nouvelles de l'Indo-Chine* (Nouv. Archives Muséum, 2^e sér. t. IV).